



## Laporan Kasus: Penanganan Dipylidiasis pada Kucing Anggora dengan Praziquantel

(Case Report: Treatment of Dipylidiasis in Angora Cats with Praziquantel)

Annisa Putri Cahyani<sup>1\*</sup>, I Nyoman Suartha<sup>2</sup>, dan Nyoman Sadra Dharmawan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Laboratorium Reproduksi dan Kesehatan Hewan, Jurusan Peternakan, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Jl. Kusumanegara No.2, POLBANGTAN, YOMA, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55167

<sup>2</sup>Laboratorium Ilmu Penyakit Dalam Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana,

<sup>3</sup>Laboratorium Patologi Klinik Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana, Kampus Bukit, Jl. Raya Kampus Unud Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361

### ARTICLE INFO

Received: 20 November 2019

Accepted: 30 Desember 2019

\*Corresponding author

[annisaputri@pertanian.go.id](mailto:annisaputri@pertanian.go.id)

Keywords:

Angora cat

Dipylidiasis,

*Dipylidium caninum*,

Praziquantel

### ABSTRACT

Dipylidiasis is a tapeworm disease that attacks cats and dogs and classified as a zoonotic disease because it can be transmitted to humans. A 2 years old female angora cat weighing 3 kg was examined with complaints of bloody diarrhea for 2 weeks. The results of native faecal examination showed the presence of *D. caninum* worm eggs. Animals diagnosed with dipylidiasis. Cat cases were treated by administering 50 mg praziquantel therapy with the recommendation of 1 tablet for 10 kg/BW orally. In conclusion, the treatment of dipylidiasis by administering praziquantel therapy has proven to be effective.

### ABSTRAK

Dipylidiasis merupakan penyakit cacing pita yang menyerang kucing dan anjing dan tergolong penyakit zoonosis karena dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Seekor kucing angora betina umur 2 tahun dengan berat badan 3 kg diperiksa dengan keluhan diare berdarah selama 2 minggu. Hasil pemeriksaan feses natif menunjukkan adanya telur cacing *D. caninum*. Hewan didiagnosa menderita dipylidiasis. Kucing kasus ditangani dengan pemberian terapi praziquantel 50 mg dengan anjuran 1 tablet untuk 10 kg/BB secara per oral. Penanganan dipylidiasis dengan pemberian terapi praziquantel terbukti efektif.

Kata Kunci:

Dipylidiasis

*Dipylidium caninum*

Kucing anggora

Praziquantel

## 1. Pendahuluan

Dipylidiasis merupakan penyakit cacing pita yang secara primer terjadi pada kucing dan anjing. Penyakit ini merupakan penyakit zoonosis karena dapat ditularkan kepada manusia melalui hospes perantara berupa pinjal atau kutu anjing. Dipylidiasis disebabkan oleh cacing pita *Dipylidium caninum* yang berpredileksi di usus halus (Atascadero Pet Hospital and Emergency Center, 2011). Manusia terutama anak-anak dapat sebagai *occasional host* (Agudo *et al.*, 2014). Di Indonesia kasus dipylidiasis pada manusia belum pernah dilaporkan. Selain anjing dan kucing sebagai hospes definitive lainnya adalah kucing dan karnivora liar. Gejala spesifik yang dapat diamati adalah ditemukannya rangkaian segmen atau segmen tunggal pada feses, menggosokkan anus pada lantai karena rasa gatal pada area perianal serta keberadaan segmen cacing pada area perianal (Yuniarti dan Lukiswanto, 2013).

*Dipylidium caninum* merupakan salah satu agen penyebab gangguan *gastrointestinal* yang umum dijumpai pada kucing. *Dipylidium caninum* merupakan anggota kelas *Cestoda*, ordo *Cyclophyllidea*, famili *Dipylididae*, genus *Dipylidium*. Tubuh cacing *D. caninum* terdiri atas kepala, leher dan *strobila* (Cabello *et al.*, 2011). Kepala cacing pita dilengkapi *bothridia*, *bothria*, atau *scolex* yang berfungsi untuk menempel pada dinding usus. *Scolex* dilengkapi dengan empat *sucker* (penghisap). Bagian anterior *scolex* terdapat organ disebut *rostellum* yang dilengkapi kait. Cacing *D. caninum* memiliki ciri khas berbentuk segmen yang dikenal sebagai *proglotid*, terdiri atas organ reproduksi baik jantan maupun betina dan berisi telur (Ramana *et al.*, 2011).

*Dipylidium caninum* memiliki panjang sampai 17-70 cm dan tebal 2-3 mm. Cacing tersebut mempunyai 4 penghisap (*sucker*) pada skoleksnya untuk melekat dan memperoleh makanan. Puluhan proglotid yang berbentuk oval memiliki alat reproduksi hermaphrodit dengan 2 buah muara genital yang terletak di sebelah lateral. Terdapat telur dalam jumlah yang banyak di dalam proglotid, disertai dengan kapsul telur yang berbentuk ovoid. Pada setiap kapsul terdapat telur sebanyak 3-30 butir dengan diameter 25-40  $\mu\text{m}$  (Rodan and Sparkes, 2012).

Beberapa penanganan kasus dipylidiasis dapat dilakukan dengan pemberian terapi *Praziquantel* dan *Niclosamide* (Saini *et al.*, 2016; Beugnet *et al.*, 2018). Penelitian tentang infeksi *D. caninum* pada kucing jarang dilakukan di Indonesia. Laporan kasus mengenai infeksi *D. caninum* dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan tindakan

penanggulangan dan pengendalian penyakit parasitik. Mengingat potensi cacing *D. caninum* sebagai agen zoonotik patogen.

## 2. Materi dan Metode

### 2.1. Sinyalemen dan Anamnesa

Seekor kucing angora betina umur 2 tahun dengan berat badan 3 kg diperiksa dengan keluhan diare berdarah selama 2 minggu. Berdasarkan keterangan pemilik, awalnya diare tanpa adanya darah sejak 10 hari, kemudian 4 hari berikutnya ditemukan darah pada feses kucing tersebut. Sejak lahir kucing belum pernah dilakukan vaksinasi maupun pemberian obat cacing. Kucing kasus dipelihara dengan cara dilepasliarkan disekitar rumah. Kucing memiliki nafsu makan dan minum yang baik, dan tetap aktif bergerak. Pakan yang diberikan berupa *dry food* dan diberikan secara *ad libitum*.

### 2.2. Pemeriksaan Fisik dan Tanda Klinis

Status present kucing kasus adalah sebagai berikut: frekuensi detak jantung 104 kali/menit; frekuensi pulsus 104 kali/menit; frekuensi respirasi 28 kali/menit; suhu tubuh 38,6 °C; dan nilai *capillary refill time* kurang dari dua detik. Pemeriksaan mukosa dan konjunktiva mata sedikit pucat, sementara pemeriksaan klinis seluruh sistem organ normal. Tanda klinis yang terlihat kucing mengalami diare berdarah dan terdapat proglotid cacing pita (Gambar 1A).

### 2.3. Pemeriksaan Penunjang


Pemeriksaan penunjang yang dilakukan adalah pemeriksaan mikroskopis feses secara natif dan pemeriksaan hematologi rutin. Hasil pemeriksaan feses natif menunjukkan adanya telur cacing *D. caninum*. Pemeriksaan hematologi rutin kucing kasus dilakukan sebelum dan sesudah diberikan terapi praziquantel. Hasil uji hematologi setelah diberikan terapi praziquantel menunjukkan terjadi penurunan nilai eosinophil. Nilai Hemoglobin dan Trombosit mengalami kenaikan.

### 2.4. Diagnosa dan Prognosa

Berdasarkan sinyalemen, anamnesa, temuan klinis, didukung dengan pemeriksaan mikroskopis feses dan hematologi rutin, kucing kasus didiagnosa menderita dipylidiasis dengan prognosa fausta karena melihat kondisi hewan secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik.

### 2.5. Penanganan

Kucing kasus ditangani dengan pemberian terapi praziquantel 50 mg dengan anjuran 1 tablet untuk 10 kg BB-1 secara per oral



Gambar 1. (A) feses kucing mengalami diare berdarah dan terdapat proglotid cacing pita; (B) Hasil pemeriksaan mikroskopis feses ditemukannya telur cacing *D. caninum* (perbesaran 10 kali).

### 3. Hasil dan Pembahasan

Isolat Hasil pemeriksaan mikroskopis feses menunjukkan adanya telur cacing *Dipylidium caninum*. Feses yang mengeluarkan darah menunjukkan adanya iritasi pada mukosa usus. Pengeluaran feses bercampur darah tersebut biasa disebut melena. Gigitan cacing yang sekaligus melekat pada mukosa segera terjadi perdarahan yang tidak segera membeku. Telur cacing *D. caninum* keluar bersama feses inang vertebrata, selanjutnya termakan oleh larva pinjal bersama sisa-sisa organik. Telur akan berkembang mencapai stadium larva sebagai

*cysticercoid* di rongga tubuh pinjal. Ketika inang vertebrata (kucing) menelan pinjal maka kucing tersebut dapat terinfeksi *D. caninum*. Akhirnya, *cysticercoid* berkembang dalam tubuh inang vertebrata menjadi cacing dewasa. Cacing dewasa berpredileksi di usus halus dan dalam jumlah besar akan menyebabkan gangguan. Infeksi berat pada hewan muda umumnya muncul gejala klinis yang tidak spesifik seperti konstipasi dan diare (Nemzek *et al.*, 2015). Manusia juga bisa terinfeksi *D. caninum* dan menimbulkan gejala klinis berupa sakit perut, mual, dan muntah (Adam *et al.* 2012).

Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Darah Hewan Kasus

Parameter	Nilai Normal	Sebelum Terapi	Setelah diberikan Terapi	Satuan
Hemoglobin	8 - 15	7,6	8	g dL <sup>-1</sup>
Eritrosit	5 - 10	7,4	7,5	10 <sup>6</sup> /mm <sup>3</sup>
Leukosit	5,5 - 19,5	12,7	12	10 <sup>3</sup> /mm <sup>3</sup>
Trombosit	300 - 700	285	305	10 <sup>3</sup> /mm <sup>3</sup>
Hematokrit	30 - 45	26	30	%
Neutrofil	35 - 75	53	50	%
Limfosit	20 - 55	20	20	%
Monosit	1 - 4	7	4	%
Eosinofil	2 - 12	15	11	%
Basofil	jarang	-	-	%
MCV	39-55	35,1	39	µm <sup>3</sup>
MCH	13 - 17	10,2	13	pg
MCHC	30-35	29,2	31	g dL <sup>-1</sup>

Sumber: Data Primer dari pengujian Laboratorium Penyakit Dalam RSH FKH Universitas Udayana

Pemeriksaan hematologi dilakukan sebelum terapi praziquantel dan 10 hari setelah diberikan terapi sebagai pembanding guna

mengetahui ada tidaknya perubahan pada nilai hematologi kucing kasus. Pemeriksaan hematologi sebelum terapi praziquantel

menunjukkan Hemoglobin, PCV/Hematokrit, MCV, MCHC dan trombosit menurun, sedangkan Monosit dan Eosinofilia mengalami peningkatan. Hal ini menginterpretasi bahwa kucing tersebut mengalami anemia mikrositik hipokromik, monositosis, eosinofilia, dan trombositopenia. Yang mengindikasikan adanya infeksi kronis dan defisiensi Fe. Menurunnya kadar zat besi karena terjadi perdarahan pada usus yang diakibatkan oleh cacing tersebut yang menghisap darah dengan antikoagulan sehingga darah terus menerus mengucur dan bercampur pada feses. Dari hasil tersebut, kucing tersebut diindikasikan mengalami peradangan yang disebabkan oleh infeksi parasit, alergi atau stress. Fungsi utama eosinofil adalah detoksifikasi, baik terhadap protein asing yang masuk ke dalam tubuh melalui paru-paru ataupun saluran cerna maupun racun yang dihasilkan oleh bakteri dan parasit. Eosinofilia dapat terjadi karena infeksi parasit, reaksi alergi dan kompleks antigen-antibodi setelah proses imun (Frandsen, 1992). Hal ini juga memperkuat bahwa kucing tersebut terinfeksi parasit dan dibuktikan oleh pemeriksaan feses yang menunjukkan positif infeksi *Dipylidium caninum*.

Pengobatan yang diberikan adalah Praziquantel. Praziquantel merupakan anthelmentik terutama untuk cestoda yang merupakan derivat dari pirazinoiskuolin.

#### 4. Kesimpulan

Kucing kasus Dipylidiasis yang ditangani dengan terapi pemberian praziquantel sebanyak 2 kali menunjukkan hasil yang efektif dan kesembuhan kasus terjadi cukup cepat yaitu pada hari ke-10 pasca pemberian terapi. Untuk mempercepat kesembuhan infeksi, maka diperlukan penanganan kasus dipylidiasis. Sebaiknya dilakukan manajemen pemberian pakan, kebersihan hewan dan lingkungan, serta pemberian obat cacing secara teratur. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh pemberian praziquantel dengan sampel yang lebih banyak.

#### 5. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih diucapkan kepada seluruh staf Laboratorium Penyakit Dalam Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana yang telah memfasilitasi dan membantu penanganan hewan kasus.

Terhadap taeniasis kucing termasuk dipylidiasis, obat yang dianjurkan adalah sebagai berikut. Praziquantel (Droncit) dosis 6,3 mg kg<sup>-1</sup> untuk kucing berat kurang dari 1,8 kg, sedang untuk yang lebih berat dari 1,8 kg dianjurkan 5 mg kg<sup>-1</sup>. Episprantel (Cestex), dengan dosis 2,75 mg kg<sup>-1</sup> (Subronto, 2010). Obat ini terabsorpsi secara cepat pada pemberian per-oral dan dimetabolisme dalam hepar sebelum diekskresikan ke dalam empedu. Metabolisme obat berlangsung cepat melalui proses hidrosilasi dan konjugasi. Kadar maksimal dalam darah tercapai dalam waktu 1-2 jam. Metabolitnya sebagian besar diekskresikan bersama urin dan sedikit diekskresikan dalam bentuk utuh. Praziquantel bekerja melalui dua cara. Pertama, pada kadar efektif terendah menimbulkan peningkatan aktivitas otot pada cacing karena hilangnya ion Ca intrasel, sehingga timbul kontraksi dan paralisis spasifik yang bersifat reversible. Hal tersebut menyebabkan terlepasnya cacing yang menempel pada dinding usus. Kedua, pada dosis terapi yang lebih tinggi praziquantel dapat menyebabkan terjadinya vakuolisasi dan vesikuolisasi pada cacing, sehingga isi cacing keluar dan dapat menyebabkan kematian pada cacing (Plumb, 2000).

#### Daftar Pustaka

- Adam AA, Saeed OM, Ibrahim HM, Malik HYE, Ahmed ME. 2012. *D. caninum* infection in a 41year old sudanese man in Nyala, Suda: the first reported case in Sudan in 2006. *Neel Med J.* 6(2):37-42.
- Agudo LG, Martos PG, dan Iglesias MR. 2014. *Dipylidium caninum* Infection in an Infant: A Rare Case Report and Literature Review. *APJTB.* 4(2):565-567.
- Atascadero Pet Hospital and Emergency Center. 2011. *Feline Tapeworm Infection.* El Camino Real Atascadero. California
- Beugnet F, Labuschagne M, dan Vos Cd, Crafford D, and Fourie J. 2018. Analysis of *Dipylidium caninum* Tapeworm from Dogs and Cats or Their Respective Fleas. *Parasite* 25(31):1-11.
- Cabello RR, Ruiz AC, Feregrino RR, Romero LC, Feregrino RR, and Zavala JT. *Dipylidium caninum* Infection. *BMJ Case Reports.* bcr.07.2011.4510.

- Ettinger, S.J. and E.C. Feldman. 2009. *Textbook of Veterinary Internal Medicine: Disease of the Dog and Cat*. 4<sup>th</sup> Ed. USA: Elsevier.
- Frandsen, RD. 1992. *Anatomi dan Fisiologi Ternak*. Edisi ke-4. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lefkaditis A.M and Koukeri SE. 2006. Prevalence of *Dipylidium caninum*, in domestic cats from the city of Thessaloniki, Greece. *Scientia Parasitologica* 1(2):100-103.
- Levine ND. 1994. *Buku Pelajaran Parasitologi Veteriner*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta. hal 163-164, 480.
- Nemzek JA, Lester PA, Wolfe AM, Dysko RC, Myers DD. 2015. *Laboratory Animal Medicine*. UK: Academic Press. pp 511-554.
- Plumb DC. 2000. *Veterinary Drug Handbook*. 4<sup>th</sup> Ed. Minnesota: PharmaVet Pub.
- Ramana KV, Rao SD, Rao R, Mohanty SK, and Wilson CG. 2011. Case Report: Human Dipylidiasis: A Case Report of *Dipylidium caninum* Infection from Karimnagar. *OJHAS*. 10(2): 1-2.
- Rodan I dan Sparkes AH. 2012. *Feline Behavioral Health and Welfare*. Elsevier. pp 151-180. UK
- Saini KV, Gupta S, Kasondra A, Rakesh RL, and Latchumikanthan A. 2016. Diagnosis and Therapeutic Management of *Dipylidium caninum* in dogs: A case report. *JPD*. 40(4): 1426-1428.
- Subekti BS, Setiawan K., Mumpuni SS, dan Kusnoto. 2011. *Ilmu Penyakit Helminth*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Subronto. 2010. *Penyakit Infeksi Parasit dan Mikroba pada Anjing dan Kucing*. Edisi ke -2. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Yuniarti MW dan Lukiswanto BS. 2013. Infeksi *Dipylidium caninum* pada Kucing. *Vetmedika JKlin Vet* 1(2):52-56.